


پیکرراز



محمد علی میگوئی
گروه آموزشی مپ



فصل ۳ دوازدهم



شکل ۳- جایگاه ژن های Rh

ژن پروتئین D در بازوی بالایی دایکرم فاصله نسبت به سانتیمر قرار دارد. البته فاصله آن تا رأس بازو نسبت به فاصله آن تا سانتیمر بیشتر است.

	گروه خونی A	گروه خونی B	گروه خونی AB	گروه خونی O
گویچه قرمز				
نوع کربوهیدرات گویچه قرمز	A	B	A و B	هیچ کدام

شکل ۶- مبنای گروه خونی ABO

تعداد کربوهیدرات A در فردی با ژنوتیپ نوره خونی AO و AA برابر است اما در فردی با ژنوتیپ نوره خونی AB نصف خواهد بود.



شکل ۱۰- خون گیری از نوزاد برای انجام آزمایش های بدو تولد

خون سردی نوزاد از پاشنه کف پای او اخذ می شود.


فصل ۳ دوازدهم



aa bb cc



AA BB CC



شکل ۹- چگونگی تعیین رنگ در ذرت

دسته دو:

۱ خالص غالب (۲) + ۲ خالص مغلوب

۱ خالص مغلوب + ۲ ناخالص (۳)

دسته چهار:

۱ خالص غالب + ۲ خالص غالب (۲)

۱ خالص غالب + ۲ ناخالص (۳)

دسته یک:

۲ خالص مغلوب + ۱ ناخالص (۲)

دسته پنج:

۲ خالص غالب + ۱ ناخالص (۳)

دسته صفر:

۳ خالص مغلوب (۳)

دسته شش:

۳ خالص غالب (۳)

دسته هفت:

۱ خالص غالب + ۱ خالص مغلوب + ۱ ناخالص (۶)

۳ خالص (۳)